

অঙ্গ ছাঁটাই: চারা অবশ্যই সাতকরা গাছের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। গাছটির অবকাঠামো সুন্দর ও মজবুত করতে গোড়া হতে অন্তত ৭৫ সেনি. উচ্চতা পর্যন্ত কোন ডাল পালা রাখা যাবে না। এর উপরে ৪-৫ ডি ডাল রেখে গাছকে একটি সুন্দর কাঠামো দিতে হবে ও কাণ্ডের উৎপাদনশীল শাখা বাড়তে হবে। প্রতিবছর ফল আহরণের পর মরা, রোগাক্রান্ত, পোকামাকড় আক্রান্ত এবং অবস্থিত ডাল ছাঁটাই করতে হয়। ডাল ছাঁটাই এর পর কর্তিত অংশে অবশ্যই আলকাতরা বা বেদেপেষ্টের প্রলেপ লাগাতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রোহস্তর পরিচর্যা: সাতকরা গাছে সাধারণত মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (বেঙ্গল্যারী থেকে মার্চ) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-শৌষ (নাভেম্বর থেকে ডিসেম্বর) মাসে ফল পরিপক্ব হয়। তবে কৃষক পর্যায়ে ফল আকারে বড় হলেই অল্প অল্প করে আহরণ করে বাজার জাত করা শুরু হয় এবং তা পুরো ফলন কাল (ফল শেষ হওয়া পর্যন্ত) ধরে চলতে থাকে। ফল সংগ্রহ করার পর ভাল ও ক্রটিপূর্ণ গুলো হোডিং এর মাধ্যমে আলাদা করে বাজারজাত করতে হবে।

রোগবালাই, পোকামাকড় ও পুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা ও সমাধান

১। লেবুর প্রজাপতি

যে কোন স্পর্শ ও পাকস্থলী বিক্রিয়া সম্পন্ন কীটনাশক (ক্লোরোপাইরিফস/ সাইপারমেথ্রিন/ ল্যামডা-সাইহেলোগ্রাট্রিন গ্রুপ) অনুমোদিত মাত্রায় ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার অথবা কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত গাছে স্প্রে করতে হবে।



লেবুর হজগতি আক্রান্ত পাতা

২। সাইট্রাস লিকমাইনর ও ক্যান্ডার

ক্যান্ডার আক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে ও কঁচি পাতায় যে কোন প্রবাহমান কীটনাশক (থায়োমেক্সাম/ ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপ) অনুমোদিত মাত্রায় ১০-১৫ দিন পরপর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। বর্ষা মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বোদুমিগ্রাণ অথবা কপার অক্সিজোরাইড অনুমোদিত মাত্রায় ১০দিন পরপর অথবা কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত গাছে স্প্রে করতে হবে।



সাইট্রাস লিকমাইনর ও আক্রান্ত পাতা

৩। সাইলিড বাগ ও গ্রীনিং

গ্রীনিং মুক্ত মাতৃগাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করতে হবে ও রোগমুক্ত চারা রোপন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কঁচি পাতায় যে কোন প্রবাহমান কীটনাশক (থায়োমেক্সাম/ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপ) অনুমোদিত মাত্রায় ১০-১৫ দিন পরপর ৩-৪ বার অথবা কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত গাছে স্প্রে করা।



সাইলিড বাগ (শিক ও পূর্ণিত পোক)

৪। গামোসিস

রোগ প্রতিরোধী রুটস্টক ব্যবহার করা এবং বর্ষার আগে ও পরে কাণ্ডে বর্দেপেষ্টের প্রলেপ দেয়া। গাছের গোড়ার মাটিতে মেটালাক্সিলন+মোনোকোজেব (রিডোমিল গোল্ড এম জেড ৭২ ডব্লিউপি) দিয়ে মাটি শোধন করা।



গামোসিস আক্রান্ত শাখা

৫। লেবুর লাল মাকড়

মাকড় নাশক এবামেকটিন/প্রোপাগাইট/ লুফেনিউরগ/ সালফার অনুমোদিত মাত্রায় প্রথমবার ফুল আসার সময় এবং দ্বিতীয়বার ফল মার্বেল আকার হওয়ার পর অথবা কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত গাছে স্প্রে করতে হবে।



৬। নাইট্রোজেন ঘাটতি ও প্রতিকার

বয়সভেদে গাছ প্রতি ২০০-৬০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার পাতায় ০.৫% ইউরিয়া সারের দ্রবণ (৫-১০ গ্রাম ইউরিয়া প্রতি লিটার পানিতে মিশাতে হবে) স্প্রে করেও নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করা যায়।



নাইট্রোজেনের অভাব জনিত হলুদ পাতা

৭। বোরন ঘাটতি ও প্রতিকার

বোরনের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ এবং গাছ প্রতি ৫-১০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ০.১% বোরাক্স দ্রবণ (১০ গ্রাম বোরাক্স ১০ লিটার পানিতে মিশাতে হবে) স্প্রে করেও বোরনের অভাব পূরণ করা যায়।



বোরন এর অভাব জনিত হলুদ পাতা

রচনায় ও সম্পদনায়

- ড. শাহ মোঃ লুৎফুর রহমান
- ড. মোঃ মসিউর রহমান
- ড. এম এইচ এম বোরহান উদ্দিন ভূইয়া
- বুটান চন্দ্র সরকার
- ফয়সল আহমেদ

অর্থায়নে:

নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদন ও তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ ক্ষম

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশকান:

জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ/আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রেজু শ্রিতর্মা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

০১৭১ ৯০৪ ৬৬৫ | ০১৭১-০৬৯২০১

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে বারি সাওকরা-৩

উৎপাদনের আধুনিক কনাকৌশল



সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জৈন্তাপুর, সিলেট-৩১৫৬

ভূমিকা


সাতকরা একটি লেবু জাতীয় অপ্রধান ফল যার খোসা বিভিন্ন ধরনের রান্নায় স্বাদ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। অপ্রধান হলেও সিলেট অঞ্চলে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এছাড়া খোসা দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের আচার তৈরি হয়। সাতকরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। গ্রন্থসী সিলেটবাসীরাই এ ফলের সবচেয়ে বড় ভোক্তা। আজকাল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষও এটি রান্না ও আচার তৈরীতে ব্যবহার হচ্ছে। এর খোসা শুকিয়েও সংরক্ষণ করা যায়। সাতকরা পাহাড়ী এলাকার একটি আদি ফল যাহা প্রাচীনকাল হতে স্থানীয় আদিবাসীদের দ্বারা রান্নাতে ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাতকরা হৃদরোগ, কাশ্মার, ফুলতা ইত্যাদির মতো রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়াও এতে বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু অন্যান্য সাইট্রাস ফলের মত সাতকরাতে ফ্যাট ও কোলেস্টেরল কম হওয়াতে যেসকল ব্যক্তি অতিরিক্ত ওজনহাসে ভূমিকা পালন করে।

প্রতি ১০০ গ্রাম (৩.৫ আউন্স) তরুণযোগ্য সাতকরা ফলে রয়েছে

শক্তি	ঃ ১৪৬ কিলোজুল (৩৫ কিলোক্যালরি)	
অর্জিত	ঃ ৯০ গ্রাম	ঃ ২২ মি.গ্রা.
প্রোটিন	ঃ ১.০ গ্রাম	ঃ ৩.৫ মি.গ্রা.
ফ্যাট	ঃ ০.৮৫ গ্রাম	ঃ ৮.৯ মি.গ্রা.
কার্বোহাইড্রেট	ঃ ১.৯ গ্রাম	ঃ ২৫ মি.গ্রা.
ভিটামিন সি	ঃ ২১০ মি.গ্রা.	ঃ ১০ মি.গ্রা.
ভিটামিন এ	ঃ ২২ মি.গ্রা.	ঃ ০.০৭ মি.গ্রা.
ভিটামিন বি ১	ঃ ০.০৮ মি.গ্রা.	ঃ ০.২১ মি.গ্রা.
ভিটামিন বি ২	ঃ ০.০১ মি.গ্রা.	ঃ ০.১৫ মি.গ্রা.

বারি সাতকরা-১

সংগৃহীত জামপ্লাজম মূল্যায়ন করে বারি সাতকরা-১ জাতটি ২০০৪ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। এ জাতের গাছ মধ্যম হুড়ানো, পাতা বড় আকারের ও সবুজ। উচ্চফলন-শীল, নিয়মিত ফল দেয়, ফল গোলাকার কিছুটা চেপ্টা, বড় আকারের (৩০০-৩৩০ গ্রাম), ফলের খোসা পুরু (১.১-১.৪ সেমি), ফলের শাঁস কম রসালো ও আটসাঁট। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন। রপ্তানিযোগ্য এ জাতটি বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে চাষাবাদযোগ্য।



বারি সাতকরা-১ (ফলধারী গাছ ও ফল)

সাতকরার আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এমন আর্দ্র ও উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে সাতকরা ভাল জন্মে। উর্বর, গভীর সুনিকশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন (পিএইচ ৫.৫-৬.০) বেলে দোআঁশ মাটি সাতকরা চাষের জন্য উত্তম। এটেল মাটি সাতকরা চাষের অনুপযোগী। সাতকরা উৎপাদনের জন্য ২৫-৩০°সে. গড় তাপমাত্রা উপযোগী। বার্ষিক ১৫০০-২৫০০ মিমি. বৃষ্টিপাত সাতকরা চাষের জন্য পর্যাপ্ত, তবে অধিক আর্দ্রতা ক্ষতিকর। সাতকরা ইষৎ বন্য পরিবেশে পছন্দ করে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সাতকরা পাহাড়ী এলাকার ফল বিধায় পাহাড়ের উত্তর পূর্ব ঢালে এটি ভাল জন্মে। জমি তৈরির জন্য প্রথমে পাহাড়ের সমস্ত আগাছা কেটে ফেলতে হবে যা মাটিতে পঁচে জৈব সারে পরিণত হবে। এরপর পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ি/ধাপ/বেসিন তৈরি করে গর্ত করতে হবে ও পানি নিকাশনের জন্য প্রয়োজনীয় নালা তৈরি করতে হবে। সিঁড়ি/ধাপ/বেসিন ব্যতিত চারা রোপন করলে মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদান বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে গিয়ে চারায় পুষ্টিউপাদানের ঘাটতি তৈরি হতে পারে।

বংশ বিস্তার: মাতৃগুণ্ডান বজায় রাখতে অঙ্গজ উপায়ে জোড় কলম (ভিনিয়ার ও ক্রেফট গ্রাফটিং) ও কুঁড়ি সংযোজন (বাডিং) পদ্ধতি ব্যবহার করে সাতকরা বংশবৃদ্ধি করতে হয়। এজন্য প্রথমে নার্সারীতে আদিজোড় হিসাবে বাতাবিলেবুর বীজ বুনে চারা উৎপাদন করতে হবে। এ চারা গুলো বয়স ৮-১০ মাস হলে বারি সাতকরা-১ জাতের উপজোড় আদিজোড়ের উপর গ্রাফটিং/বাডিং প্রক্রিয়ায় চারা উৎপাদন করতে হবে। কলম করার অন্তত ৬ মাস পর সেটি মাঠে রোপন করা উচিত।

রোপনের সময়: মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-আশ্বিন (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপনের উপযুক্ত সময়।

গর্ত তৈরি: চারা রোপনের জন্য ৩×৩ মি. দূরত্বে ১×১×১ মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তটি ৫-৭ দিন উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। এরপর গর্তের উপরে মাটির সাথে ২০ কেজি জৈব সার, ৩-৫ কেজি ছাই, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমগ্রপি সার মিশাতে হবে। এরপর গর্তের উপরে মাটি গর্তের নিচে এবং গর্তের নিচের মাটি গর্তের উপর দিয়ে ভরাট করতে হবে এবং ১০-১৫ দিন ফেলে রাখতে হবে। বৃষ্টি না হলে গর্তে হালকা স্বেচ দিতে হবে যাতে গর্তের সম্পূর্ণ সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশে যায়।

কলম রোপন: গর্তের ঠিক মধ্যখানে নির্বাচিত কলমটি লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পরপরই স্বেচ দিতে হবে। চারটি যান্ত্রে হেলে না পড়ে সেজন্য চারার গোড়ায় আড়াআড়িভাবে একটি বাঁশের কক্ষি পুতে দিতে হবে। কলমটি সুরক্ষায় বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা: মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে সঠিক সময়ে, সঠিক পরিমানে ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ আবশ্যিক।

গাছের বয়স অনুযায়ী গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

গাছের বয়স (বছর)	কম্পোস্ট (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
গর্তে	১০-১৫	-	২৫০	১৫০
১-২ বছর	১২-১৫	১০০	১০০	১০০
২-৩ বছর	১৫-১৮	৩৫০	২৫০	২৫০
৪-৫ বছর	২০-৩০	৫০০	৩৫০	৩৫০
৬-৭ বছর	৩৫-৫০	৬৫০	৫০০	৪৫০
৮-৯ বছর	৬০-৮০	৮০০	৭৫০	৬০০
১০ তম বর্ষ	৯০-১০০	১২৫০	১০০০	১০০০

গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও ভাল ফলন পেতে তিন কিস্তিতে মধ্য মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) ১ম বার, বর্ষার পূর্বে মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) ২য় বার, এবং বর্ষার পরে মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ৩য় বার সার প্রয়োগ করা উত্তম। মাটির উর্বরতা এবং গাছের অবস্থা বিবেচনায় সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে। তবে মাটি অধিক অম্লীয় হলে গর্ত প্রতি ২০০ গ্রাম ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন: আগাছা গাছের সাথে পানি, পুষ্টিউপাদান, আলো নিয়ে প্রতিযোগিতা করা ছাড়াও বিভিন্ন রোগ ও পোকাকার বিকল্প পোষক হিসাবে কাজ করে। একারণে নতুন স্থাপিত বাগান অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। পুরাতন বাগান ফল সংগ্রহের পর বছরে অন্তত একবার আগাছা মুক্ত করতে হবে।

পরগাছা দমন: সাতকরা গাছে তেমন পরগাছা জন্মাতে দেখা যায় না। তবে পরগাছায় আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্রই পরগাছা অপসারণ করতে হবে।

পানি স্বেচ ও নিকাশন: ফুল বারা কমাতে ও অধিক ফলন নিশ্চিত করতে বয়স্ক গাছে খরা মৌসুমে (মধ্য ফেব্রুয়ারী হতে মধ্য এপ্রিল) ১৫ দিন পর পর ২-৩ টি স্বেচ দিতে হবে। মাটিবাহিত রোগের প্রকোপ কমাতে অতিরিক্ত পানি নিকাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।